

UPUTE ZA UPOTREBU

VISMED® - natrijev hijaluronat dobiven fermentacijom 0,18 %.

Kapi za oči, za podmazivanje..

Sterilne, bez konzervansa

Sastav: 1 ml otopine sadrži: natrijev hijaluronat 1,8 mg, natrijev klorid, kalijev klorid, dinatrijev fosfat, natrijev citrat, magnezijev klorid, kalcijev klorid i vodu za injekcije. Otopina je hipotonična.

Indikacije: simptomi i znaci suhog oka i/ili oštećenje površine oka, zbog bolesti poput površinskog keratitisa, Sjögrenovog sindroma ili primarnog sindroma suhog oka. Za podmazivanje očiju u slučaju osjećaja suhoće, pečenja i umora očiju te drugih manjih, nepatoloških smetnji (tegoba), izazvanih npr. prašinom, dimom, suhim, toplim zrakom, klima uređajima, vjetrom, hladnoćom, dugim radom na ekranu računala ili nošenjem kontaktnih leća (krutih ili mekih).

Kontraindikacije: individualna preosjetljivost na bilo koji sastojak proizvoda.

Interakcije: VISMED® ne koristite istovremeno s bilo kojim drugim lijekom ili proizvodom primijenjenim na oko, jer bi oni mogli promijeniti učinak preparata VISMED®.

Neželjeni učinci: u vrlo malo slučajeva prolazne smetnje poput iritacije spojnice oka, osjećaj stranog tijela, crvenilo ili osjećaj pečenja u oku, a može se dogoditi i kratkotrajno zamagljenje vida.

Doziranje i primjena: odvmite poklopac. Nagnite glavu unatrag, a vrh bočice postavite iznad oka u koje želite ukapati proizvod. Kažiprstom jedne ruke pomaknite donji kapak nadolje. Stisnite bočicu pa će jedna kapljica VISMED®-a lako isteći (vidi slike). Ako nije preporučeno drugačije, kapnite 1 ili 2 kapljice VISMED®-a u oko po potrebi. Nakon treptanja otopina će se razliti (raširiti) i stvoriti proziran dugotrajan film na površini oka. VISMED® se može koristiti i kada nosite kontaktne leće (krute ili meke).

Mjere opreza kod upotrebe: Ne dirajte vrh otvorene bočice i ne dirajte površinu oka vrhom otvorene bočice. Inače, bočicu morate baciti odmah nakon upotrebe. Kako VISMED® ne sadrži konzervanse, svu otopinu koja se ne iskoristi odmah nakon otvaranja, treba baciti. Ako je bočica oštećena, VISMED® nemojte koristiti. VISMED® čuvajte na temperaturi između 2° i 25° C! VISMED® nemojte koristiti po isteku roka trajanja koji je otisnut na bočici i na kutijici. Ako tijekom upotrebe VISMED®-a i dalje budete osjećali neugodu, zatražite savjet liječnika. VISMED® čuvajte van dohvata djece!

Karakteristike i način djelovanje: VISMED® sadrži natrijev hijaluronat, prirodni polimer, koji se također nalazi i u ljudskom oku. Posebne fizikalne karakteristike natrijevog hijaluronata daju VISMED®-u njegovu "visko-elastičnost" i sposobnost zadržavanja vode. Na površini oka, VISMED® stvara stabilan film koji se treptanjem polako uklanja. Prema tome, VISMED® kombinira dugotrajno olakšanje s najvećom udobnošću. Zbog svog jedinstvenog sastava, VISMED® se dobro podnosi. VISMED® ne sadrži konzervanse.


Pakiranje: 20 bočica s jednom dozom od 0,3 ml.

Datum posljednje dopune upute: srpanj 2011


Broj odobrenja: UP/I-530-09/12-05/24

Proizvođač:
TRB CHEMEDICA AG
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar / München,
Germany

Nositelj odobrenja:
Dea lens project d.o.o.
J.J.Strossmayera 150, Osijek, Hrvatska



1. Odvrite poklopac.



2. Kapnite otopinu u oko.



3. Ne upotrebljavajte ponovno!
(Nakon upotrebe bacite)